



GROUPE HOSPITALIER DE LA RÉGION DE MULHOUSE ET SUD ALSACE

Hôpital Emile Muller

INFORMATION PATIENT : PROTOCOLE ÉRYTHROPOÏÉTINE

Pôle AMBRE

Anesthésie, Ambulatoire,
Blocs opératoires,
Réanimation Chirurgicale

UF d'orthopédie, traumatologie et spécialités chirurgicales

Responsable UF :

Dr MALASSINE Patrick
Tel. du secrétariat 03 89 64 61 51

Praticiens hospitaliers :

Dr FATTOUH, Dr HAMOUD, Dr SAUMIER, Dr SOMMER, Dr SALB Dr WASILEWSKI

Assistants spécialistes :

Dr BALVAY, Dr DE LA CAFFINIÈRE

Anesthésie gynécologie-obstétrique

Chef de service :

Dr TSCHIEMBER Marc
Tel. du secrétariat 03 89 64 69 78

Praticiens hospitaliers :

Dr CHAPUIS, Dr GASSNER-GROSSHENNY

UF cardiovasculaire et thoracique

Chef de service :

Dr GANSTER Frédérique
Tel. du secrétariat 03 89 64 70 52 / 03 89 64 81 73

Praticiens hospitaliers :

Dr CORNEA, Dr SEMENESCU

UF pathologies uro-digestives

Responsable UF :

Dr THEISSEN-LAVAL Odile
Tel. du secrétariat 03 89 64 70 52 / 03 89 64 81 73

Praticiens hospitaliers :

Dr AHLSCHEWEDE, Dr BARBERET, Dr DUFOUR, Dr GHEORGHUI, Dr ROMAIN

Réanimation Chirurgicale

Chef de service :

Dr MEYER Christian
Tel. du secrétariat 03 89 64 76 20 / 03 89 64 76 40

Praticiens hospitaliers :

Dr GALLY, Dr KHEBBEB, Dr ZAME

Anesthésie THANN

Responsable :

Dr FREY
Tel. du secrétariat : 03.89.37.71.12

Praticiens hospitaliers :

Dr DAYOUB, Dr FINKELSTEIN, Dr KONDRATAS

Madame, Monsieur,

Le médecin anesthésiste vous a prescrit un schéma thérapeutique afin de **stimuler la fabrication de globules rouges** avant l'intervention dont vous allez bénéficier. L'objectif de ce traitement est de diminuer le risque de recourir à une transfusion au décours de l'intervention, mais également **d'améliorer votre réhabilitation postopératoire**.

Pour récupérer ces produits en pharmacie, vous devez vous munir :

- de l'**ordonnance** « Pharmacie » délivrée par le médecin anesthésiste,
- de votre **carte vitale**,
- de votre **carte de mutuelle**.

NB : La sécurité sociale prend en charge 65% du prix du médicament. Les 35% restants sont à la charge de votre mutuelle.

Les flacons sont à conserver impérativement au **réfrigérateur, entre +2°C et +8°C**.

Trois injections seront pratiquées par une infirmière, à 1 semaine d'intervalle, durant les 3 semaines précédant l'opération. La troisième injection est soumise **au résultat d'une prise de sang** que **vous devrez réaliser une dizaine de jour avant l'opération** (*pas besoin d'être à jeun*).

Certains **effets indésirables** de ce médicament sont possibles :

- des plaques rouges sur la peau,
- un syndrome pseudo grippal : maux de tête, sensation de faiblesse, douleurs articulaires, vertiges,
- une augmentation de la tension artérielle,
- *très rarement : thrombose veineuse ou artérielle, augmentation des plaquettes.*

En cas de questions, n'hésitez pas à appeler : 03 89 64 61 51

Secrétariat anesthésie A :
secr-anesth-a@ch-mulhouse.fr
Fax 03 89 64 70 33

Secrétariat anesthésie B :
secr-anesth-b@ch-mulhouse.fr
Fax 03 89 64 61 52

Secrétariat anesthésie C :
secr-anesth-c@ch-mulhouse.fr
Fax 03 89 64 69 55

Secrétariat Réa chir:
secr-reachir@ch-mulhouse.fr
Fax 03 89 64 76 19